

抗HIV薬と他の薬剤、サプリメントとの“飲み合わせ”について

よく使用される抗HIV薬と他の薬剤、サプリメントとの飲み合わせについて記載しています。

記載されていない抗HIV薬の他剤との飲み合わせについて、記載のある抗HIV薬でも飲み合わせが不明な点がある際には、HIV担当医師、薬剤師へお問い合わせください。

記載薬剤について

1. ビクタルビ配合錠について (2 ページ)
2. トリーメク配合錠について (3 ページ)
3. テビケイ錠 50mg について (4 ページ)
4. アイセントレス 400mg について (5 ページ)
5. アイセントレス 600mg について (6 ページ)
6. エジュラント錠 25mg について (7-8 ページ)
7. デシコビ配合錠 HT、LT について (9 ページ)

問い合わせ先

琉球大学病院 薬剤部、HIV 診療チーム

TEL : 098-895-3331

作成 2020年7月

琉球大学病院 薬剤部 上原、諸見



ビクタルビ配合錠を内服中の方

※ビクタルビと一緒に飲んではいけない薬剤、サプリメント

薬剤名（一般名）	商品名	薬効	飲み合わせ
リファンピシン	リファジン® <input checked="" type="checkbox"/> など	結核治療薬	併用によりビクタルビの効果が減弱します
カルバマゼピン	テグレートール® <input checked="" type="checkbox"/> など	てんかん治療薬、抗精神病薬、三叉神経痛治療薬	併用によりビクタルビの効果が減弱します
フェノバルビタール	フェノバル® <input checked="" type="checkbox"/> など	てんかん治療薬、鎮静薬、睡眠薬	併用によりビクタルビの効果が減弱します
フェニトイン、ホスフェニトイン	アレピアチン® <input checked="" type="checkbox"/> ホストイン® <input checked="" type="checkbox"/> など	てんかん治療薬	併用によりビクタルビの効果が減弱します
セイヨウオトギリソウ（セントジョーンズワート）を含む健康食品など	セントジョーンズワートなど（サプリメントとして販売）	うつ病やリラックス効果为目的として使用	併用によりビクタルビの効果が減弱します

※ビクタルビと一緒に飲む際には注意が必要な薬剤、サプリメント

薬剤名（一般名）	商品名	薬効	飲み合わせ	併用時の注意点
メトホルミン	メトグルコ® <input checked="" type="checkbox"/> など	糖尿病治療薬	併用により、メトホルミンの効果が強くなる恐れがあります	低血糖や乳酸アシドーシスに注意。併用が必要な際は、メトホルミンを低用量からの開始などを検討する。
ピルジカイニド	サンリズム® <input checked="" type="checkbox"/> など	抗不整脈薬	併用により、ピルジカイニドの効果が強くなる恐れがあります	心臓への副作用が出現する恐れがあります。併用の際は、副作用の出現に注意。
マグネシウム アルミニウム 鉄 亜鉛 カルシウム 銅を含む薬剤、サプリメント	酸化マグネシウム® <input checked="" type="checkbox"/> スクラルファート® <input checked="" type="checkbox"/> カルタン® <input checked="" type="checkbox"/> プロマック® <input checked="" type="checkbox"/> フェロミア® <input checked="" type="checkbox"/> アスパラ C A® <input checked="" type="checkbox"/> など 多数	下剤、胃薬、貧血治療薬、高リン血漿治療薬、ミネラル補給サプリメントなど多数	内服時間が近いと、ビクタルビの吸収が低下し、ビクタルビの効果が減弱する恐れがあります	併用が必要な場合には、十分に時間をあけて内服する。ビクタルビ内服後、6時間程度はあけて使用する



トリーメク配合錠を内服中の方

※トリーメクと一緒に飲む際には注意が必要な薬剤、サプリメント

薬剤名（一般名）	商品名	薬効	飲み合わせ	併用時の注意点
メトホルミン	メトグルコ [®] <input checked="" type="checkbox"/> など	糖尿病治療薬	併用により、メトホルミンの効果が強くなる恐れがあります	低血糖や乳酸アシドーシスに注意。併用が必要な際は、メトホルミンを低用量からの開始などを検討する。
ピルジカイニド	サンリズム [®] <input checked="" type="checkbox"/> など	抗不整脈薬	併用により、ピルジカイニドの効果が強くなる恐れがあります	心臓への副作用が出現する恐れがあります。併用の際は、副作用の出現に注意。
マグネシウム アルミニウム 鉄 亜鉛 カルシウム 銅 含有薬剤、サプリメント	酸化マグネシウム [®] <input checked="" type="checkbox"/> スクラルファート [®] <input checked="" type="checkbox"/> カルタン [®] <input checked="" type="checkbox"/> プロマック [®] <input checked="" type="checkbox"/> フェロミア [®] <input checked="" type="checkbox"/> アスパラ CA [®] <input checked="" type="checkbox"/> など多数	下剤、胃薬、貧血治療薬、高リン血漿治療薬、ミネラル補給サプリメントなど多数	内服時間が近いと、トリーメクの吸収が低下し、トリーメクの効果が減弱する恐れがあります	併用が必要な場合には、十分に時間をあけて内服。トリーメク内服後、6時間程度はあけて使用して下さい。
リファンピシン	リファジン [®] <input checked="" type="checkbox"/> など	結核治療薬	併用によりトリーメクの効果が減弱します	抗 HIV 薬の用量調節が必要になることがあります。どうしても使用が必要なときは、HIV 治療担当医師へ相談ください。
カルバマゼピン	テグレトール [®] <input checked="" type="checkbox"/> など	てんかん治療薬、抗精神病薬、三叉神経痛治療薬	併用によりトリーメクの効果が減弱します	
フェノバルビタール	フェノバル [®] <input checked="" type="checkbox"/> など	てんかん治療薬、鎮静薬、睡眠薬	併用によりトリーメクの効果が減弱します	
フェニトイン、 ホスフェニトイン	アレビアチン [®] <input checked="" type="checkbox"/> ホストイン [®] <input checked="" type="checkbox"/> など	てんかん治療薬	併用によりトリーメクの効果が減弱します	
セイヨウオトギリソウ（セントジョーンズワート）を含む健康食品など	セントジョーンズワートなど（サプリメントとして販売あり）	うつ病やリラックス効果を目的として使用	併用によりトリーメクの効果が減弱します	

テビケイ錠 50mg を内服中の方



※テビケイと一緒に飲む際には注意が必要な薬剤、サプリメント

薬剤名（一般名）	商品名	薬効	飲み合わせ	併用時の注意点
メトホルミン	メトグルコ [®] <input checked="" type="checkbox"/> など	糖尿病治療薬	併用により、メトホルミンの効果が強くなる恐れがあります	低血糖や乳酸アシドーシスに注意。併用が必要な際は、メトホルミンを低用量からの開始などを検討する。
ピルジカイニド	サンリズム [®] <input checked="" type="checkbox"/> など	抗不整脈薬	併用により、ピルジカイニドの効果が強くなる恐れがあります	心臓への副作用が出現する恐れがあります。併用の際は、副作用の出現に注意。
マグネシウム アルミニウム 鉄 亜鉛 カルシウム 銅 含有薬剤、サプリメント	酸化マグネシウム [®] <input checked="" type="checkbox"/> スクラルファート [®] <input checked="" type="checkbox"/> カルタン [®] <input checked="" type="checkbox"/> プロマック [®] <input checked="" type="checkbox"/> フェロミア [®] <input checked="" type="checkbox"/> アスパラ C A <input checked="" type="checkbox"/> など多数	下剤、胃薬、貧血治療薬、高リン血漿治療薬、ミネラル補給サプリメントなど多数	内服時間が近いと、テビケイの吸収が低下し、テビケイの効果が減弱する恐れがあります	併用が必要な場合には、十分に時間をあけて内服。テビケイ内服後、6時間程度はあけて使用して下さい。
リファンピシン	リファジン [®] <input checked="" type="checkbox"/> など	結核治療薬	併用によりテビケイの効果が減弱します	抗 HIV 薬の用量調節が必要になることがあります。どうしても使用が必要なときは、HIV 治療担当医師へ相談ください。
カルバマゼピン	テグレトール [®] <input checked="" type="checkbox"/> など	てんかん治療薬、抗精神病薬、三叉神経痛治療薬	併用によりテビケイの効果が減弱します	
フェノバルビタール	フェノバル [®] <input checked="" type="checkbox"/> など	てんかん治療薬、鎮静薬、睡眠薬	併用によりテビケイの効果が減弱します	
フェニトイン、 ホスフェニトイン	アレビアチン [®] <input checked="" type="checkbox"/> ホストイン [®] <input checked="" type="checkbox"/> など	てんかん治療薬	併用によりテビケイの効果が減弱します	
セイヨウオトギリソウ（セントジョーンズワート）を含む健康食品など	セントジョーンズワートなど（サプリメントとして販売あり）	うつ病やリラックス効果を目的として使用	併用によりテビケイの効果が減弱します	



アイセントレス錠 400mg を内服中の方

※アイセントレスと一緒に飲む際には注意が必要な薬剤、サプリメント

薬剤名（一般名）	商品名	薬効	飲み合わせ	併用時の注意点
マグネシウム アルミニウム 鉄 亜鉛 カルシウム 銅 含有薬剤、サプリメント	酸化マグネシウム [®] <input checked="" type="checkbox"/> スクラルファート [®] <input checked="" type="checkbox"/> カルタン [®] <input checked="" type="checkbox"/> プロマック [®] <input checked="" type="checkbox"/> フェロミア [®] <input checked="" type="checkbox"/> アスパラ CA [®] <input checked="" type="checkbox"/> など多数	下剤、胃薬、貧血治療薬、高リン血漿治療薬、ミネラル補給サプリメントなど多数	内服時間が近いと、アイセントレスの吸収が低下し、アイセントレスの効果が減弱する恐れがあります	併用が必要な場合には、十分に時間をあけて内服。アイセントレス内服後、6時間程度はあけて使用して下さい。
リファンピシン	リファジン [®] <input checked="" type="checkbox"/> など	結核治療薬	併用によりアイセントレスの効果が減弱する恐れがあります	抗 HIV 薬の用量調節が必要になることがあります。どうしても使用が必要なときは、HIV 治療担当医師へ相談ください。
カルバマゼピン	テグレトール [®] <input checked="" type="checkbox"/> など	てんかん治療薬、抗精神病薬、三叉神経痛治療薬	併用によりアイセントレスの効果が減弱する恐れがあります	
フェノバルビタール	フェノバル [®] <input checked="" type="checkbox"/> など	てんかん治療薬、鎮静薬、睡眠薬	併用によりアイセントレスの効果が減弱する恐れがあります	
フェニトイン、 ホスフェニトイン	アレビアチン [®] <input checked="" type="checkbox"/> ホストイン [®] <input checked="" type="checkbox"/> など	てんかん治療薬	併用によりアイセントレスの効果が減弱する恐れがあります	
セイヨウオトギリソウ（セントジョーンズワート）を含む健康食品など	セントジョーンズワートなど(サプリメントとして販売あり)	うつ病やリラックス効果を目的として使用	併用によりアイセントレスの効果が減弱する恐れがあります	



アイセントレス錠 600mg を内服中の方

※アイセントレス錠 600mg と一緒に飲む際には注意が必要な薬剤、サプリメント

薬剤名（一般名）	商品名	薬効	飲み合わせ	併用時の注意点
マグネシウム アルミニウム 鉄 亜鉛 カルシウム 銅 含有薬剤、サプリメント	酸化マグネシウム® <input checked="" type="checkbox"/> 、 マグミット® <input checked="" type="checkbox"/> スク ラルファート® <input checked="" type="checkbox"/> カル タン® <input checked="" type="checkbox"/> プロマック ® <input checked="" type="checkbox"/> フェロミア® <input checked="" type="checkbox"/> ア スバラ CA® <input checked="" type="checkbox"/> など多 数	下剤、胃薬、貧血治療 薬、高リン血漿治療 薬、ミネラル補給サブ リメントなど多数	内服時間が近いと、 アイセントレスの吸 収が低下し、アイセ ントレスの効果が減 弱する恐れがありま す	併用が必要な場合に は、十分に時間をあ けて内服。アイセン トレス錠 600mg 内服 前後 12 時間 あけて 使用して下さい。
リファンピシン	リファジン® <input checked="" type="checkbox"/> など	結核治療薬	併用によりアイセン トレスの効果が減 弱する恐れがあり ます	抗 HIV 薬の用量調節 が必要になること があります。どう しても使用が必要 なときは、HIV 治 療担当医師へ相談 ください。
カルバマゼピン	テグレートール® <input checked="" type="checkbox"/> など	てんかん治療薬、抗精 神病薬、三叉神経痛 治療薬	併用によりアイセン トレスの効果が減 弱する恐れがあり ます	
フェノバルビタール	フェノバル® <input checked="" type="checkbox"/> など	てんかん治療薬、鎮静 薬、睡眠薬	併用によりアイセン トレスの効果が減 弱する恐れがあり ます	
フェニトイン、 ホスフェニトイン	アレビアチン® <input checked="" type="checkbox"/> ホストイン® <input checked="" type="checkbox"/> など	てんかん治療薬	併用によりアイセン トレスの効果が減 弱する恐れがあり ます	
セイヨウオトギリソ ウ（セントジョーン ズワート）を含む健 康食品など	セントジョーンズワ ートなど（サブリメ ントとして販売あ り）	うつ病やリラックス 効果を目的として 使用	併用によりアイセン トレスの効果が減 弱する恐れがあり ます	

エジュラント錠 25mg を内服中の方



※エジュラントと一緒に飲んではいけない薬剤、サプリメント

薬剤名（一般名）	商品名	薬効	飲み合わせ
プロトンポンプ阻害薬 オメプラゾール ランソプラゾール ラベプラゾール エソメプラゾール ボノプラザン	オメプラゾール®☒ タケキャブ®☒ パリエット®☒ ネキシウム®☒ タケキャブ®☒	強力に胃酸を抑える薬剤	エジュラントの吸収が低下し、エジュラント錠の効果が減弱します。
デキサメタゾン (単回投与を除く)	デカドロン®☒	ステロイド 抗炎症作用、免疫抑制作用 など	エジュラントの効果が減弱する恐れがあります
リファンピシン	リファジン®☒など	結核治療薬	併用によりエジュラントの効果が減弱します
カルバマゼピン	テグレート®☒など	てんかん治療薬、抗精神病薬、三叉神経痛治療薬	併用によりエジュラントの効果が減弱します
フェノバルビタール	フェノバル®☒など	てんかん治療薬、鎮静薬、睡眠薬	併用によりエジュラントの効果が減弱します
フェニトイン、 ホスフェニトイン	アレピアチン®☒ ホストイン®☒など	てんかん治療薬	併用によりエジュラントの効果が減弱します
セイヨウオトギリソウ（セントジョーンズワート）を含む健康食品など	セントジョーンズワートなど（サプリメントとして販売あり）	うつ病やリラックス効果を目的として使用	併用によりエジュラントの効果が減弱します

次ページに続きます

※エジュラント錠 25mg と一緒に飲む際には注意が必要な薬剤、サプリメント

薬剤名（一般名）	商品名	薬効	飲み合わせ	併用時の注意点
H2遮断薬 ファモチジン シメチジン ニザチジン ラニチジン （市販の様々な薬剤にも含まれている可能性があります。市販の薬剤使用時には胃酸を抑える成分が含まれていないか確認して下さい）	ガスター® <input checked="" type="checkbox"/> タガメット® <input checked="" type="checkbox"/> アシノン® <input checked="" type="checkbox"/> プロテカジン® <input checked="" type="checkbox"/> など	胃酸を抑える	エジュラントの吸収が低下し、エジュラント錠の効果が減弱します。	可能であれば併用は避ける。併用が必要であれば、エジュラント内服の12時間以上前に使用。もしくはエジュラント内服4時間以上後に使用。
水酸化アルミニウム 沈降炭酸カルシウム 酸化マグネシウム などの胃酸を抑える作用のある成分 （市販の様々な薬剤にも含まれている可能性があります。市販の薬剤使用時には胃酸を抑える成分が含まれていないか確認して下さい）	酸化マグネシウム® <input checked="" type="checkbox"/> アドソルビン® <input checked="" type="checkbox"/> 沈降炭酸カルシウム® <input checked="" type="checkbox"/> など	胃酸を抑える	エジュラントの吸収が低下し、エジュラント錠の効果が減弱します。	可能であれば併用は避ける。併用が必要であれば、エジュラント内服の2時間以上前に使用。もしくはエジュラント内服4時間以上後に使用。
クラリスロマイシン エリスロマイシン	クラリス® <input checked="" type="checkbox"/> エリスロシン® <input checked="" type="checkbox"/>	抗生剤	併用により、エジュラントの血中濃度が上昇する恐れがあります	併用の際には副作用の出現に注意。アジスロマイシン（抗生剤）での代替を検討。
QT 延長を起こすことが知られている薬剤 アミオダロン、 ソタロールなど	アンカロン® <input checked="" type="checkbox"/> など	様々な種類の薬剤	QT 延長や心室性頻拍などの心臓の副作用が出現する恐れがあります。	併用の際には心臓への副作用の出現に注意。

デシコビ配合錠 HT、LT を内服中の方



※デシコビ HT、LT と一緒に飲んではいけない薬剤、サプリメント

薬剤名（一般名）	商品名	薬効	飲み合わせ
テラプレビル	テラビック® <input checked="" type="checkbox"/>	C型肝炎治療薬	併用によりデシコビの効果が減弱します

※デシコビ配合錠 HT、LT と一緒に飲む際には注意が必要な薬剤、サプリメント

薬剤名（一般名）	商品名	薬効	飲み合わせ	併用時の注意点
リファンピシン、 リファブチン	リファジン® <input checked="" type="checkbox"/> ミコブティン® <input checked="" type="checkbox"/> など	結核治療薬	併用によりデシコビの効果が減弱する恐れがあります	抗 HIV 薬の用量調節が必要になることがあります。どうしても使用が必要なときは、HIV 治療担当医師へ相談ください。
カルバマゼピン	テグレート® <input checked="" type="checkbox"/> など	てんかん治療薬、抗精神病薬、三叉神経痛治療薬	併用によりデシコビの効果が減弱する恐れがあります	
フェノバルビタール	フェノパール® <input checked="" type="checkbox"/> など	てんかん治療薬、鎮静薬、睡眠薬	併用によりデシコビの効果が減弱する恐れがあります	
フェニトイン、 ホスフェニトイン	アレビアチン® <input checked="" type="checkbox"/> ホストイン® <input checked="" type="checkbox"/> など	てんかん治療薬	併用によりデシコビの効果が減弱する恐れがあります	
セイヨウオトギリソウ（セントジョーンズワート）を含む健康食品など	セントジョーンズワートなど（サプリメントとして販売あり）	うつ病やリラックス効果を目的として使用	併用によりデシコビの効果が減弱する恐れがあります	